

***Cancro**

É uma DST que se caracteriza por lesões genitais ulceradas e dolorosas que evoluem com a supuração dos linfonodos inguinais. É causada pelo *Hemophilus ducreyi* e o período de incubação de 3 a 7 dias após o contato sexual.

***Sífilis**

É uma doença infecciosa causada pela bactéria *Treponema pallidum*. A infecção através de objetos contaminados é muito rara, pois a bactéria morre em contato com o ar. Os sintomas possuem dois estágios, o primeiro estágio é caracterizado por uma pequena lesão na região de contágio, de três a seis semanas após a contração. As lesões são extremamente infecciosas. O segundo estágio cerca de seis semanas mais tarde com úlceras doloridas desenvolvem-se na boca, assim como em várias regiões do corpo, com pequenas protuberâncias, dores de cabeça e febre. Estes sintomas desaparecem de 3 a 12 semanas, então a doença entra em estágio latente, porém as inflamações podem instalar-se em órgãos internos, na qual pode durar de 20 a 30 dias. Geralmente ocorre neurosífilis, que pode levar a paralisia. Durante este estágio, infecções no trato urinário podem, em uma gravidez, levar ao aborto ou ao nascimento de uma criança portadora de sífilis congênita. As crianças apresentam sinais como: testa grande, nariz seliforme e dentes mal formado. A droga mais usada no tratamento é a penicilina benzatina, e também o uso da camisinha, na qual oferece alguma proteção contra a sífilis.